

رضایت خط تابلیت‌های پتاسیم آیوداید

رضایت خط در مورد مصرف تابلیت‌های پتاسیم آیوداید

والدین محترم! سرپرستان قانونی محترم!

وزارت صحت اتریش از بیش از 30 سال قبل تا فعلاً تابلیت‌های پتاسیم آیوداید را بصورت رایگان در اختیار مردم – و بنابراین همچنان در اختیار مکاتب و مهد طفل‌ها قرار می‌دهد.

چرا و چه وقت مصرف تابلیت‌های پتاسیم آیوداید مهم است؟

در صورت آزاد شدن آیود رادیواکتیو در اثر یک سانحه نیروگاه هسته‌ای، تابلیت‌های پتاسیم آیوداید آیود پایدار بدن را تامین می‌کنند و به این ترتیب از قرار گرفتن تیراید در معرض تشعشعات بالا جلوگیری می‌کنند.

چرا در وقت یک سانحه رآکتور مصرف به موقع تابلیت‌های پتاسیم آیوداید مهم است؟ تابلیت‌های پتاسیم آیوداید تنها در

صورتی از شخص محافظت می‌کنند که قبل از رسیدن توده‌های هوای رادیواکتیو مصرف شوند. به این ترتیب بدن برای «ایجاد» محافظت وقت دارد. برای آن که بتوان توزیع به موقع برای طفل شما را تضمین نمود، این تابلیت‌ها از قبل در موسسات تعلیمی ذخیره شده‌اند.

توزیع تابلیت‌های پتاسیم آیوداید چه وقت و به دستور چه کسی در مکتب صورت می‌گیرد؟

تجویز تابلیت‌ها فقط بنا به درخواست صریح مراجع حفاظت در مقابل تشعشعات مجاز است. برای این که به طفل شما صرفاً در وقت خطر هسته‌ای مستقیم پتاسیم آیوداید محافظت کننده – جهت مصرف بنا به درخواست مراجع حفاظت در مقابل تشعشعات – توسط مکتب داده شود تا با خود به خانه ببرد، مکتب به رضایت شما ضرورت دارد.

لطفاً معلومات ضمیمه شده از طرزالعمل مصرف مربوط به تابلیت‌های پتاسیم آیوداید را با دقت مطالعه نمایید و رضایت خط امضا شده را به طفلتان بدهید تا با خود به مکتب بیاورد. تشکر!

(شما رضایت خط‌ها را به زبان جرمنی و 12 زبان دیگر بصورت آنلاین نیز پیدا کرده می‌توانید: www.schularzt.at فورم‌ها)

مدیریت

رضایت خط

تاریخ تولد:

نام طفل:

نام سرپرست قانونی:

○ بلی، من (برای مدت تحصیل در این مرکز) رضایت می‌دهم که بنا به درخواست مراجع حفاظت در مقابل تشعشعات تابلیت‌های پتاسیم آیوداید به طفل من تسلیم داده شود. من تایید می‌کنم که در مورد طفل خود از موارد عدم تحمل و موارد منع مصرف برای مصرف این تابلیت‌ها اطلاعی ندارم و در صورت مطلع شدن از موارد عدم تحمل یا موارد منع مصرف هرچه عاجل به مکتب اطلاع خواهم داد.

○ خیر، من رضایت نمی‌دهم

امضا:

تاریخ:

اطلاعات مربوط به تابلیت های پتاسیم ایوداید (از دستورالعمل استفاده)

تابلیت پتاسیم ایوداید نباید مصرف شود:

- اگر غده تیروئید زیاد فعال دارید
- ندول های خوش خیم تیروئید که درمان نشده. با این درمان نشده "گره های تیروئید داغ" درمان نشده خطر تولید بیش از حد هورمون های تیروئید وجود دارد که در بدترین حالت می تواند منجر به واکنش های قلبی عروقی تهدید کننده زندگی شود.
- در صورت حساسیت (حساسیت) به اویدین. این بسیار نادر است و نباید با آلرژی رایج به مواد حاجب (که برای بهبود نمایش اندام های مختلف در روش های تصویربرداری مانند تشخیص ایکس ری یا اشعه ایکس استفاده می شود) اشتباه گرفته شود.
- اگر به هر یک از اجزای دیگر قرص ها (نشاسته جواری، مونوهیدرات لاکتوز، سیلوز میکروکریستالین، بنیادی بیوتل میتاکریلیت کاپولیمیر، مگنیزیم استئارات) حساسیت دارید.
- اگر به **dermatitis herpetiformis Duhring** (بیماری که باعث تاول، قرمزی پوست، دانه، کهپر و سوزش شدید، ترجیحاً در آرنج یا زانو می شود) دارید.
- در التهاب دیواره رگ های خونی ناشی از آلرژی (hypocomplementemic vasculitis).

هنگام استفاده تابلیت های پتاسیم ایوداید مراقبت های ویژه لازم است:

- اگر مشکوک به تومور بدخیم غده تیروئید باشد. تومورهای تیروئید با ایودین رادیواکتیو درمان می شوند. اگر پتاسیم ایوداید به مقدار زیاد مصرف شود، می تواند درمان تومور را غیرممکن کند.
- اگر بیماری دارید که لوله هوای تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد. دادن سطوح بالای ایودین می تواند باعث رشد غده تیروئید شود و تنگی لوله هوای تنفسی موجود را بدتر کند.
- اگر کودک شما تحت درمان با مهارکننده های تیروئید (دوهای ضد تیروئید) است. لطفاً از داکتر خود پرسید که آیا کودک شما می تواند تابلیت پتاسیم ایوداید مصرف کند یا خیر.

مصرف تابلیت پتاسیم ایوداید همراه با سایر دواهای دیگر

- عملکرد تابلیت های پتاسیم ایوداید تحت تأثیر موارد زیر است:
دوایی که بر متابولیسم تیروئید تأثیر می گذارند (مانند پرکلرات، تیوسیانات در غلظت های بالای 5 میلی گرم/در دسی لیتر). آنها جذب ایودین توسط تیروئید را مهار می کنند.
- تابلیت پتاسیم ایوداید بر عملکرد موارد زیر تأثیر می گذارد:
مهارکننده های تیروئید (تیروستاتیکا)
پتاسیم ایوداید **G.L حاوی لاکتوز است**. اگر می دانید که کودک شما به قند حساسیت دارد، لطفاً از داکتر خود پرسید که آیا کودک شما می تواند تابلیت پتاسیم ایوداید مصرف کند یا خیر.

چه عوارض جانبی ممکن است؟

مانند همه داروها، تابلیت پتاسیم ایوداید می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد دچار آن نمی شوند. عوارض جانبی زیر مشاهده شده است:

نادر (ممکن است از هر 1000 نفر 1 نفر را تحت تأثیر قرار دهد):

- یک آلرژی ناشناخته به ایودین ممکن است برای اولین بار ظاهر شود. علائم آلرژیک مانند سرخی پوست، خارش و سوزش چشم، آبریزش بینی، سرفه خشک، اسهال، سردرد و علائم مشابه ممکن است رخ دهد. واکنش های تهدیدکننده حیات، به ویژه در مورد درمان تیتس هریبی فورمیس دورینگ (بیماری که در آن، از جمله، تاول ها و سرخی پوست، ترجیحاً روی آرنج یا زانو رخ می دهد، ممکن است (به بالا مراجعه کنید: «تابلیت های پتاسیم ایودید نباید مصرف شوند.»)
- التهاب عروقی (مانند پری آرتریت ندوزا).

بسیار نادر (ممکن است از هر 10000 نفر 1 نفر را تحت تأثیر قرار دهد):

- پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید مرتبط با ایودین. علائم پرکاری تیروئید می تواند شامل افزایش ضربان قلب، عرق کردن، بی خوابی، لرزش، اسهال و کاهش وزن با وجود افزایش اشتها باشد. اگر چنین علائمی دارید، باید با داکتر مشورت کنید.

ناشناخته (از دیتا موجود نمی توان تخمین زد):

- تحریک مخاط معده ممکن است رخ دهد، به خصوص هنگام مصرف تابلیت پتاسیم ایوداید با معده خالی.
- التهاب غدد بزاقی
- ناراحتی در دستگاه گوارش (ناراحتی در راه معده)
- بثورات خفیف

قانون کلی:

در صورت نیاز به اطلاعات یا مشاوره بیشتر از داکتر یا دواساز (دواخانه) خود پرسید.