

Declarație de consimțământ pentru comprimate de iodură de potasiu

Declarație de consimțământ pentru administrarea comprimatelor de iodură de potasiu

Dragi părinți! Dragi tutori!

De mai bine de 30 de ani, Ministerul austriac al Sănătății furnizează gratuit populației comprimate de iodură de potasiu – inclusiv școlilor și grădinițelor.

De ce și când este important să luați comprimate de iodură de potasiu?

În cazul unei eliberări de iod radioactiv din cauza unui accident la o centrală nucleară, comprimatele de iodură de potasiu furnizează organismului iod stabil și previn astfel expunerea ridicată a glandei tiroide la radiații.

De ce este important să luați la timp comprimatele de iodură de potasiu în cazul unui accident la un reactor? Comprimatele de iodură de potasiu oferă protecție doar dacă sunt luate ÎNAINTE de

sosirea maselor de aer radioactiv. Astfel, organismul are timp să își „construiască” protecția. Pentru a asigura distribuția la timp a comprimatelor pentru copilul dvs., acestea sunt deja depozitate la instituțiile de învățământ.

Când și la indicațiile cui sunt distribuite la școală comprimatele de iodură de potasiu?

Comprimatele pot fi administrate doar la cererea expresă a autorităților de radioprotecție. Școala are nevoie de permisiunea dvs. pentru a-i da copilului dvs. iodură de potasiu de protecție pe care să o ia acasă de la școală doar în cazul unui pericol nuclear imediat – la cererea autorităților de radioprotecție.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile atașate din instrucțiunile de utilizare pentru comprimatele de iodură de potasiu și să îi dați copilului dvs. declarația de consimțământ semnată pentru a o aduce la școală. Vă mulțumim!

(Declarațiile de consimțământ în limba germană și în alte 12 limbi sunt disponibile online: Formulare tipărite: www.schularzt.at)

Direcția

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Numele copilului:

Data nașterii:

Semnătura tutorelui legal:

- DA, îmi dau consimțământul (pe durata vizitei la centru) pentru administrarea de comprimate de iodură de potasiu copilului meu, la cererea autorităților de radioprotecție. Confirm că nu am cunoștință de nicio intoleranță sau contraindicație la administrarea comprimatelor pentru copilul meu și că voi informa imediat școala în cazul în care voi lua cunoștință de orice intoleranță sau contraindicație.
- NU, nu îmi dau consimțământul

Data:

Semnătura:

Informații cu privire la pastilele de iodură de potasiu (citat din Ghidul de utilizare)

Pastilele de iodură de potasiu nu vor fi administrate:

- în caz de **hipertiroidie**
- în cazul unor **noduli tiroidieni necanceroși** care nu sunt tratați. În cazul unor așa-numiți „noduli tiroidieni fierbinți” netratați, există pericolul unei supraproducerii masive de hormoni tiroidieni, ceea ce poate duce în cel mai rău caz la reacții cardio-vasculare care pun în pericol viața.
- în caz de **alergie** (hipersensibilitate) la iod. Aceasta este foarte rară și nu trebuie confundată cu alergia la mijloacele de contrast care este frecventă (acestea servesc la o mai bună reprezentare a diverselor organe în procedeele imagistice ca de pildă diagnosticarea cu raze X).
- în caz de **alergie** la alte componente ale pastilelor (amidon din porumb, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, copolimer bazic de acrilat de butil, stearat de magneziu).
- în caz de **dermatită herpetiformă Dühring** (o boală la care apar vezicule, înroșiri și erupții locale pe piele, umflături și urticarie aprinsă, cu preponderență la cot sau la genunchi).
- în cazul **inflamațiilor din cauze alergice ale pereților vasculari** (vasculită hipocomplementemică).

O atenție deosebită este necesară la administrarea pastilelor de iodură de potasiu:

- în caz de suspiciune față de existența unei **tumori maligne a glandei tiroide**. Tumorile tiroidiene sunt tratate cu iod radioactiv. Dacă se ingerează iodură de potasiu în cantitate mare, acest lucru va face imposibilă tratarea tumorilor.
- în cazul unei boli care afectează **traheea**. Prin administrarea unor cantități mari de iod, glanda tiroidă va putea crește, astfel încât restrângerea traheii se va înrăutăți și mai mult.
- dacă copilul dvs. este tratat cu **inhibitori tiroidieni (tireostatic)**. Vă rugăm să întrebați medicul dvs. dacă copilul dvs. poate să ia pastilele de iodură de potasiu.

Administrarea pastilelor de iodură de potasiu cu alte medicamente

- **Efectul pastilelor de iodură de potasiu este influențat de:** medicamentele care influențează metabolismul tiroidian (de ex. perclorat, tiocianură în concentrații peste 5 mg/dl). Acestea opresc absorbirea iodului de către glanda tiroidă.
- **Pastilele de iodură de potasiu influențează efectul:** inhibitori tiroidieni (tireostatic)

Iodura de potasiu G.L. conține lactoză. Vă rugăm să întrebați medicul dvs. dacă copilul dvs. poate să ia pastilele de iodură de potasiu, în cazul în care cunoașteți dacă copilul dvs. suferă de o intoleranță la zahăr.

Care sunt efectele secundare posibile?

Ca și toate medicamentele, pastilele de iodură de potasiu pot avea efecte secundare care însă nu trebuie să apară la fiecare persoană.

S-au observat următoarele efecte secundare:

Rar (poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane tratate):

- poate să apară pentru prima dată o alergie la iod care nu era cunoscută înainte. În acest caz, pot apărea fenomene alergice ca de ex. înroșirea pielii, senzație de mâncărime și arsură la ochi, rinită, tuse uscată, diaree, cefalee și alte afecțiuni. Mai ales în cazul dermatitei herpetiforme Dühring (o boală la care apar printre altele vezicule și înroșiri ale pielii, cu preponderență la cot sau la genunchi, sunt posibile reacții periculoase pentru viață (a se vedea mai sus: „Pastilele de iodură de potasiu nu vor fi administrate”).
- Inflamații ale peretelui arterial (de ex. periarterita nodoasă).

Foarte rar (poate afecta până la 1 von 10.000 de persoane tratate):

- hipertiroidie sau hipotiroidie cauzată de iod. Semnele unei hipertiroidii pot fi pulsul mărit, transpirația excesivă, insomniile, tremur, diaree și scăderea în greutate în ciuda poftelor de mâncare mărite. Se va consulta medicul în cazul apariției unor astfel de afecțiuni.

Necunoscut (frecvența nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile):

- Iritarea mucoasei gastrice poate apărea mai ales la ingerarea pastilelor de iodură de potasiu pe stomacul gol.
- inflamații ale glandelor salivare
- afecțiuni ale tractului gastro-intestinal
- erupții cutanate ușoare

În general se recomandă:

Întrebați medicul sau farmacistul dvs. în cazul în care aveți nevoie de alte informații sau recomandări.