

Заявление о согласии на выдачу и прием таблеток с йодидом калия

Заявление о согласии на прием таблеток с йодидом калия

Дорогие родители! Дорогие опекуны!

Уже более 30 лет австрийское министерство здравоохранения бесплатно предоставляет населению таблетки с йодидом калия – в том числе школьникам и воспитанникам детских садов.

Когда и почему важно принимать таблетки с йодидом калия?

В случае распространения радиоактивного йода при аварии на атомной электростанции таблетки с йодидом калия снабжают тело стабильным йодом и таким образом предотвращают высокую лучевую нагрузку на щитовидную железу.

Почему при аварии на реакторе так важен своевременный прием таблеток с йодидом

калия? Таблетки с йодидом калия могут защитить только в том случае, если их приняли ДО прихода радиоактивных воздушных масс. Тогда у тела есть время «подготовить» защиту. Чтобы обеспечить своевременную выдачу таблеток вашему ребенку, их хранят непосредственно в учебных заведениях.

Когда и по чьему указанию осуществляется выдача таблеток с йодидом калия в школе?

Таблетки можно давать только в соответствии с однозначным указанием ведомств, ответственных за защиту от радиации. Школе нужно ваше согласие, чтобы исключительно в случае непосредственной ядерной угрозы ваш ребенок мог получить от школы таблетки с йодидом калия и взять их домой – для приема по указанию ведомств, ответственных за защиту от радиации.

Пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемые данные из инструкции по применению таблеток с йодидом калия, подпишите заявление о согласии и дайте его ребенку в школу. Спасибо!

(Заявление о согласии на немецком языке и 12 других языках вы можете найти в Интернете: [распечатки: www.schularzt.at](http://www.schularzt.at))

Дирекция

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

Имя и фамилия ребенка:

Дата рождения:

Имя и фамилия лица, ответственного за воспитание:

- ДА, я даю согласие (на время посещения учебного заведения) на выдачу моему ребенку таблеток с йодидом калия по требованию ведомства, ответственного за защиту от радиации. Я подтверждаю, что мне ничего не известно о возможной непереносимости и противопоказаниях приема таблеток, и что в случае, если мне станет известно о возможной непереносимости и противопоказаниях, я немедленно сообщу об этом сотрудникам школы.
- НЕТ, я не даю согласия

Дата:

Подпись:

Информация о таблетках йодида калия (из содержания инструкции по применению)

Таблетки йодида калия нельзя принимать

- при **гиперфункции щитовидной железы**
- при **доброкачественных узлах в щитовидной железе**, неподлежащих лечению. При так называемых неподлежащих лечению «горячих узлах» в щитовидной железе имеется опасность массивной гиперсекреции гормонов щитовидной железы, способной в худшем случае привести к опасным для жизни реакциям в сердечно-сосудистой системе.
- при **аллергии** (гиперчувствительности) на йод. Такое бывает очень редко, и это явление нельзя путать с зачастую встречающимися аллергиями на контрастные вещества, предназначенные для улучшения отображения различных органов при визуализационных обследованиях, например, рентгенодиагностике.
- при **аллергии** на иные компоненты таблеток (кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, микрокристаллическую целлюлозу, основной сополимер бутилметакрилата, стеарат магния).
- при **герпетиформном дерматите Дюринга** (заболевании, к проявлению которого относятся пузырьки на коже, ее покраснение, кожная сыпь, папулы и сильный жгучий зуд, в основном в локтевой и коленной области).
- при аллергически обусловленных **воспалениях стенок кровеносных сосудов** (гипокомплементарном васкулите).

Особую осторожность при приеме таблеток йодида калия необходимо соблюдать

- при подозрении на **злокачественную опухоль щитовидной железы**
Опухоли щитовидной железы подвергаются лечению с применением радиоактивного йода. Принятие йодида калия в больших количествах может привести к невозможности лечения опухоли.
- при заболевании, связанном с **дыхательным горлом**. Принятие больших количеств йода может привести к росту щитовидной железы, что еще больше ухудшит уже имеющееся сужение дыхательного горла.
- Если Ваш ребенок проходит лечение **веществами, замедляющими гиперфункцию щитовидной железы (тиреостатиками)**. Спросите своего врача, можно ли Вашему ребенку принимать таблетки йодида калия.

Принятие таблеток йодида калия в сочетании с другими медикаментами

- **На действенность таблеток йодида калия могут повлиять** медикаменты, влияющие на обмен веществ в щитовидной железе (например, «Perchlorat», «Thiocyanat» в концентрации более 5 мг/дл). Они «тормозят» восприятие йода щитовидной железой.
- **Таблетки йодида калия оказывают влияние на действенность** веществ, замедляющих гиперфункцию щитовидной железы (тиреостатиков)

Медикамент «Kaliumjodid G.L.» содержит лактозу. Спросите, пожалуйста, своего врача, можно ли Вашему ребенку принимать таблетки йодида калия, если Вам известна непереносимость сахара Вашего ребенка.

Какие побочные воздействия возможны?

Как и все медикаменты таблетки йодида калия могут вызывать побочные воздействия, которые, однако, проявляются не у каждого.

Наблюдались следующие побочные воздействия:

Редко (возможны у 1 из 1000 пациентов):

впервые может проявиться неизвестная ранее аллергия на йод. При этом возможны такие проявления аллергии как, например, покраснение кожи, зуд и жжение в глазах, насморк, сухой кашель, диарея, головные боли и подобные. Особенно при герпетиформном дерматите Дюринга (заболевании, к проявлению которого относятся, среди прочего, пузырьки на коже и ее покраснение, в основном в локтевой и коленной области) возможны опасные для жизни реакции (см. выше «Таблетки йодида калия нельзя принимать»).

- воспаления сосудов (например, узелковый периартериит).

Очень редко (возможны у 1 из 10000 пациентов):

- связанная с йодом гиперфункция или гипофункция щитовидной железы. Признаками гиперфункции щитовидной железы могут являться учащенный пульс, повышенное потоотделение, бессонница, дрожь, диарея и потеря веса несмотря на усиление аппетита. При наличии подобных признаков необходима консультация врача.

Неизвестно (на основании имеющейся информации распространенность не может быть установлена):

- раздражение слизистых оболочек желудка возможно, в первую очередь, при принятии таблеток йодида калия на пустой желудок.
- воспаление слюнных желез
- осложнения в желудочно-кишечном тракте
- небольшая сыпь

В любом случае:

При необходимости в дополнительной информации или консультации обратитесь, пожалуйста, к своему врачу или к своему аптекарю.