

Scrisoarea părinților pentru urgențe radiologice

În atenția tutorilor legali ai:

Nume, clasa:.....

Data:.....

Dragi tutori!

Autoritățile federale de radioprotecție ne-au informat cu privire la o **urgență radiologică**. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ORF (TV, radio Ö3 și www.orf.at) precum și site-ul www.notfallschutz.gv.at.

Comprimate de iodură de potasiu:

- Au fost administrate la școală în conformitate cu instrucțiunile autorităților de radioprotecție
- Au fost date elevului pentru a le lua acasă, administrare doar după instrucțiuni explicite din partea autorităților de radioprotecție
- Nu există o declarație de consimțământ pentru administrarea de comprimate de iodură de potasiu. Comprimatele de iodură de potasiu pentru copii și adolescenți pot fi obținute gratuit din farmacii.

Autoritățile de radioprotecție vor furniza informații cu privire la procedurile ulterioare și la orice măsuri de protecție necesare.

Cu stimă,

Informații cu privire la pastilele de iodură de potasiu (citată din Ghidul de utilizare)

Pastilele de iodură de potasiu nu vor fi administrate:

- în caz de **hipertiroidie**
- în cazul unor **noduli tiroidieni necanceroși** care nu sunt tratați. În cazul unor așa-numiți „noduli tiroidieni fierbinți” netratați, există pericolul unei supraproducerii masive de hormoni tiroidieni, ceea ce poate duce în cel mai rău caz la reacții cardio-vasculare care pun în pericol viața.
- în caz de **alergie** (hipersensibilitate) la iod. Aceasta este foarte rară și nu trebuie confundată cu alergiile la mijloacele de contrast care este frecventă (acestea servesc la o mai bună reprezentare a diverselor organe în procedeele imagistice ca de pildă diagnosticarea cu raze X).
- în caz de **alergie** la alte componente ale pastilelor (amidon din porumb, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, copolimer bazic de acrilat de butil, stearat de magneziu).
- în caz de **dermatită herpetiformă Dühring** (o boală la care apar vezicule, înroșiri și erupții locale pe piele, umflături și urticarie aprinsă, cu preponderență la cot sau la genunchi).
- în cazul **inflamațiilor din cauze alergice ale pereților vasculari** (vasculită hipocomplementemică).

O atenție deosebită este necesară la administrarea pastilelor de iodură de potasiu:

- în caz de suspiciune față de existența unei **tumori maligne a glandei tiroide**. Tumorile tiroidiene sunt tratate cu iod radioactiv. Dacă se ingerează iodură de potasiu în cantitate mare, acest lucru va face imposibilă tratarea tumorilor.
- în cazul unei boli care afectează **traheea**. Prin administrarea unor cantități mari de iod, glanda tiroidă va putea crește, astfel încât restrângerea traheii se va înrăutăți și mai mult.
- dacă copilul dvs. este tratat cu **inhibitori tiroidieni (tireostatic)**. Vă rugăm să întrebați medicul dvs. dacă copilul dvs. poate să ia pastilele de iodură de potasiu.

Administrarea pastilelor de iodură de potasiu cu alte medicamente

- **Efectul pastilelor de iodură de potasiu este influențat de:** medicamentele care influențează metabolismul tiroidian (de ex. perclorat, tiocianură în concentrații peste 5 mg/dl). Acestea opresc absorbirea iodului de către glanda tiroidă.
- **Pastilele de iodură de potasiu influențează efectul:** inhibitori tiroidieni (tireostatic)

Iodura de potasiu G.L. conține lactoză. Vă rugăm să întrebați medicul dvs. dacă copilul dvs. poate să ia pastilele de iodură de potasiu, în cazul în care cunoașteți dacă copilul dvs. suferă de o intoleranță la zahăr.

Care sunt efectele secundare posibile?

Ca și toate medicamentele, pastilele de iodură de potasiu pot avea efecte secundare care însă nu trebuie să apară la fiecare persoană.

S-au observat următoarele efecte secundare:

Rar (poate afecta până la 1 din 1.000 de persoane tratate):

- poate să apară pentru prima dată o alergie la iod care nu era cunoscută înainte. În acest caz, pot apărea fenomene alergice ca de ex. înroșirea pielii, senzație de mâncărime și arsură la ochi, rinită, tuse uscată, diaree, cefalee și alte afecțiuni. Mai ales în cazul dermatitei herpetiforme Dühring (o boală la care apar printre altele vezicule și înroșiri ale pielii, cu preponderență la cot sau la genunchi, sunt posibile reacții periculoase pentru viață (a se vedea mai sus: „Pastilele de iodură de potasiu nu vor fi administrate”).
- Inflamații ale peretelui arterial (de ex. periarterita nodoasă).

Foarte rar (poate afecta până la 1 din 10.000 de persoane tratate):

- hipertiroidie sau hipotiroidie cauzată de iod. Semnele unei hipertiroidii pot fi pulsul mărit, transpirația excesivă, insomniile, tremur, diaree și scăderea în greutate în ciuda poftelor de mâncare mărite. Se va consulta medicul în cazul apariției unor astfel de afecțiuni.

Necunoscut (frecvența nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile):

- Iritarea mucoasei gastrice poate apărea mai ales la ingerarea pastilelor de iodură de potasiu pe stomacul gol.
- inflamații ale glandelor salivare
- afecțiuni ale tractului gastro-intestinal
- erupții cutanate ușoare

În general se recomandă:

Întrebați medicul sau farmacistul dvs. în cazul în care aveți nevoie de alte informații sau recomandări.