

Лист батькам на випадок радіаційної небезпеки

Законним представникам:

Ім'я, клас.....

Дата:

Шановні батьки й опікуни!

Федеральне відомство з радіаційного захисту оприлюднило інформацію про **радіаційну небезпеку**. Додаткову інформацію можна отримати на Австрійському радіо (ТБ, радіостанція Ö3 та www.orf.at) і на сайті www.notfallschutz.gv.at.

Таблетки калію йодиду:

- Видано у школі за вказівкою відомства з радіаційного захисту
- Видано учневі додому, щоб він приймав їх лише за спеціальною вказівкою відомства з радіаційного захисту
- Відсутня заява про надання згоди на прийом таблеток калію йодиду. Таблетки калію йодиду для дітей і підлітків можна отримати безкоштовно в аптеках.

Відомство з радіаційного захисту проінформують Вас про подальшу процедуру й необхідні захисні заходи.

З повагою, адміністрація школи

Інформація про калій-йодид (таблетки) (відповідає інструкції до лікарського засобу)

Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки):

- при **гіпертиреозі щитоподібної залози**
- при **доброякісних вузлах у щитоподібній залозі**, які не лікуються. При так званих нелікованих «гарячих вузлах щитоподібної залози» існує небезпека масового надлишкового виробітку гормонів щитоподібної залози, які в найгіршому випадку можуть призвести до небезпечних для життя реакцій серцево-судинної системи.
- при **алергії** (підвищеній індивідуальній чутливості) на йод. Така алергія являє собою рідкісний випадок і її не слід плутати з частими випадками алергії на контрастні речовини (які використовуються для покращення відображення різних органів під час процедур візуалізації, наприклад, рентген-діагностики).
- при **алергії** на інші компоненти препарату (кукурудзяний крохмаль, лактозу моногідрат, мікрокристалічну целюлозу, основний сополімер бутілметакрилату, стеарат магнію).
- при **герпетиформному дерматиті Дюрінга** (захворювання, основними проявами якого є: пухирі, почервоніння шкіри, шкірний висип та сильний пекучий свербіж, переважно на ліктях або колінах).
- при алергічному **запаленні стінок кровоносних судин** (гіпокомплементемічний васкуліт).

Слід бути особливо обережним при застосуванні калію-йодиду (таблетки):

- при підозрі на **злоякісну пухлину щитоподібної залози**. Пухлини щитоподібної залози лікуються радіоактивним йодом. Прийом калію-йодиду у великих кількостях може унеможливити лікування пухлини.
- при захворюваннях, що вражають **трахею**. Прийом великих доз йоду може призвести до росту щитоподібної залози, що безпосередньо призведе до ще більшого погіршення стану вже наявного звуження трахеї.
- якщо ваша дитина проходить лікування з використанням **інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних препаратів)**. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування Вашою дитиною калію-йодиду (таблетки).

Взаємодія калію-йодиду (таблетки) з іншими лікарськими засобами

- **На дію калію-йодиду (таблетки) впливають:** лікарські засоби, які впливають на метаболізм щитоподібної залози (напр., перхлорат, тиоціанати у концентрації вище 5 мг/дл). Вони пригнічують поглинання йоду щитоподібною залозою.
- **Калій-йодид (таблетки) впливає на дію:** Інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних препаратів)

Препарат Kaliumjodid G.L. містить лактозу. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування Вашою дитиною калію-йодиду (таблетки), якщо Вам відомо, що у Вашої дитини непереносимість цукру.

Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, калій-йодид (таблетки) має побічні дії, які можуть проявлятися не у всіх.

Спостерігалися наступні побічні дії:

Рідко (можуть зустрічатися у однієї з 1000 осіб, які лікуються):

- Може вперше з'явитися невідома алергія на йод. При цьому така алергічна реакція може мати наступні прояви: почервоніння шкіри, свербіж та печіння в очах, нежить, рефлекторний кашель, діарея, головний біль та інші симптоми. Можливі небезпечні для життя реакції, особливо у випадку наявного герпетиформного дерматиту Дюрінга (захворювання, проявами якого в тому числі є: пухирі та почервоніння шкіри, переважно на ліктях або колінах) (див. вище: «Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки)»).
- Васкуліт (запалення судин) (наприклад, вузликовий періартеріїт).

Дуже рідко (можуть зустрічатися у однієї з 10000 осіб, які лікуються):

- гіпертиреоз або гіпотиреоз щитоподібної залози. Ознаками гіпертиреозу можуть бути: підвищений пульс, підвищена пітливість, безсоння, тремор, діарея та втрата ваги, не дивлячись на підвищений апетит. При таких симптомах слід звернутися до лікаря.

Частота невідома (оцінка частоти неможлива через відсутність доступних даних):

- прийом калію-йодиду (таблетки) на порожній шлунок може спричинити подразнення слизової оболонки шлунку.
- запалення слинних залоз
- дискомфорт у шлунково-кишковому тракті
- незначний шкірний висип

У загальному випадку:

Зверніться до вашого лікаря або фармацевта для отримання додаткової інформації або поради.