

Izjava o saglasnosti za tablete kalijum-jodida

Izjava o saglasnosti za uzimanje tableta kalijum-jodida

Dragi roditelji! Dragi staratelji!

Preko 30 godina austrijsko Ministarstvo zdravlja stanovništvu besplatno obezbeđuje tablete kalijum-jodida, pa tako i škole i vrtići.

Zašto je važno uzimanje tableta kalijum-jodida?

Ako dođe do oslobođanja radioaktivnog joda u slučaju nuklearne nesreće, tablete kalijum-jodida obezbeđuju stabilan jod telu i na taj način sprečavaju izlaganje štitaste žlezde velikoj količini zračenja.

Zašto je važno blagovremeno uzimanje tableta kalijum-jodida u slučaju kvara nuklearnog reaktora?

Tablete kalijum-jodida pružaju zaštitu samo ako su uzete PRE pojave radioaktivnih vazdušnih masa. Tada telo ima vremena da „izgradi“ zaštitu. U cilju blagovremenog deljenja deci tablete se čuvaju u obrazovnim ustanovama.

Kada se i po čijem nalogu dele tablete kalijum-jodida u školi?

Tablete se smeju davati samo po izričitom nalogu organa za zaštitu od zračenja. Školi je potrebna vaša saglasnost kako bi vašem detetu isključivo u slučaju neposredne nuklearne opasnosti smela dati da ponese kući tablete kalijum-jodida – radi uzimanja po nalogu organa za zaštitu od zračenja.

Pažljivo pročitajte priložene informacije u uputstvu za upotrebu tableta kalijum-jodida i dajte potpisu saglasnost detetu da ponese u školu. Hvala!

(izjave o saglasnosti na nemačkom i još 12 jezika pronaći ćete na internetu: verzije za štampu: www.schularzt.at)

Uprava

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Ime i prezime deteta:

Datum rođenja:

Ime i prezime roditelja/staratelja:

- DA, saglasan/saglasna sam da (tokom trajanja pohađanja ustanove) mom detetu po nalogu organa za zaštitu od zračenja budu date tablete kalijum-jodida. Potvrđujem da mi kod deteta nisu poznate netolerancije i kontraindikacije za uzimanje tableta i da ću školu bez odlaganja obavestiti ako saznam za netolerancije ili kontraindikacije.
- NE, ne dajem saglasnost

Datum:

Potpis:

Informacije o tabletama kalijum-jodida (preuzete iz uputstva za upotrebu)

Tablete kalijum-jodida ne smeju se uzimati:

- u slučaju **pojačanog rada štitaste žlezde**;
- u slučaju **dobroćudnih čvorova u štitastoj žlezdi** koji se ne mogu lečiti. U slučaju nelečenih tzv. „vrućih“ čvorova u štitastoj žlezdi postoji opasnost od znatno pojačanog lučenja hormona štitaste žlezde, što u najgorem slučaju može dovesti do kardiovaskularnih reakcija opasnih po život;
- u slučaju **alergije** (preosetljivosti) na jod. Ovo je izuzetno retko stanje i ne treba ga mešati s učestalom alergijom na kontrastna sredstva (služe za bolji prikaz različitih organa u postupcima medicinskog snimanja, npr. rendgenska dijagnostika);
- u slučaju **alergije** na ostale sastojke tableta (kukuruzni skrob, lakoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, osnovni butil metakrilat kopolimer, magnezijum-stearat);
- u slučaju **herpetiformnog dermatitisa** (Duringove bolesti: oboljenje kod koga se javlja plikovi, crvenilo i osip na koži, koprivnjača i svrab praćen žarenjem, najčešće na laktovima ili kolenima);
- u slučaju alergijama izazvanih **zapaljenja zidova krvnih sudova** (hipokomplementarni vaskulitis).

Poseban oprez pri uzimanju tableta kalijum-jodida potreban je:

- u slučaju sumnje na **zločudni tumor štitaste žlezde**. Tumori štitaste žlezde leče se radioaktivnim jodom. Uzimanje većih količina kalijum-jodida može onemogućiti lečenje tumora;
- u slučaju bolesti koje pogađaju **dušnik**. Davanjem velikih količina joda može doći do uvećanja štitaste žlezde, čime se dodatno pogoršava već prisutno suženje dušnika;
- ako se vaše dete leči **antitireoidnim lekovima (tireostaticima)**. Pitajte svog lekara da li vaše dete sme da uzima tablete kalijum-jodida.

Uzimanje tableta kalijum-jodida sa drugim lekovima

Na dejstvo tableta kalijum-jodida utiču:

lekovi koji imaju uticaja na metabolizam štitaste žlezde (npr. perhlorat, tiocijanat u koncentracijama iznad 5 mg/dl). Ovi lekovi inhibiraju resorciju joda u štitastoj žlezdi;

Tablete kalijum-jodida utiču na dejstvo:

antitireoidnih lekova (tireostatika).

Lek Kalijumjodid G.L. sadrži lakozu. Pitajte svog lekara da li vaše dete sme da uzima tablete kalijum-jodida ako vam je poznata netolerancija na šećer kod vašeg deteta.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, tablete kalijum-jodida mogu imati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

Retko (javljaju se kod 1 od 1.000 osoba):

- može se ispoljiti dotad nepoznata alergija na jod. Pritom se mogu javiti znakovi alergije, npr. crvenilo na koži, svrab i pečenje u očima, curenje nosa, nadražajni kašalj, proliv, glavobolja i slične tegobe. Posebno u slučaju prisutnog herpetiformnog dermatitisa (Duringove bolesti: oboljenje kod koga se javlja plikovi i crvenilo na koži, pre svega na laktovima ili kolenima) moguće su reakcije opasne po život (videti gore: „Tablete kalijum-jodida ne smeju se uzimati“);
- zapaljenje krvnih sudova (npr. periarteritis nodosa).

Veoma retko (javljaju se kod 1 od 10.000 osoba):

- pojačan ili usporen rad štitaste žlezde uzrokovani jodom. Znakovi pojačanog rada štitaste žlezde mogu biti povišen puls, napadi znojenja, nesanica, drhtavica, proliv i gubitak na težini uprkos pojačanom apetitu. U slučaju ovakvih tegoba javite se lekaru.

Nepoznato (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- iritacija sluzokože želuca može se javiti posebno pri uzimanju tableta kalijum-jodida natašte (na prazan želudac);
- zapaljenje pljuvačnih žlezda;
- tegobe u probavnom traktu;
- blagi osip po koži.

U načelu važi:

Pitajte svog lekara ili farmaceuta ako su vam potrebne informacije ili savet.