

اعلام رضایت برای مصرف تابلیت پتاسیم ایوداید

والدین عزیز! سپرستان محترم قانونی!

حادثه راکتور چرنوبیل منجر به افزایش شدید سرطان تیروئید ناشی از تشعشع در میان کودکان و جوانان در مناطق به شدت آلوده اطراف چرنوبیل شده است. دلیل این امر ایودین رادیواکتیو است که در تصادفات شدید راکتور به مقدار زیادی آزاد می شود. پس از جذب توسط بدن، در غده تیروئید ذخیره می شود که منجر به قرار گرفتن در معرض تابش موضعی زیاد می شود.

مصرف به موقع تابلیت پتاسیم ایوداید غده تیروئید را با ایودین پایدار اشباع می کند و در نتیجه از ذخیره ایودین رادیواکتیو جلوگیری می کند. که باغس تابش غده تیروئید و در نتیجه بروز سرطان تیروئید ناشی از تشعشع را عملاً به صفر می رساند. با این حال، پیش نیاز این است که قرص ها قبل از رسیدن توده های هوای رادیواکتیو مصرف شوند.

مصرف به موقع تابلیت پتاسیم ایوداید محافظت بسیار موثری در برابر سرطان تیروئید ناشی از تشعشعات ایجاد می کند.

تابلیت پتاسیم ایوداید در مکاتب و مکاتب شبانه روزی نگهداری می شود تا از مصرف به موقع آن اطمینان حاصل شود. با این حال، فقط با رضایت قبلی شما می توان آن را به فرزندان داد. با امضای فرم رضایت زیر، می توانید اجازه تحویل به فرزندان را بدهید.

در صورت وقوع حادثه در راکتور، تابلیتهای پتاسیم ایوداید تنها در صورت درخواست صریح مقامات حفاظت در برابر تشعشعات ارائه می شوند.

قبل از دادن رضایت، لطفاً اطلاعات ضمیمه شده در دستورالعمل استفاده از تابلیت های پتاسیم ایوداید را به دقت مطالعه کنید.

اطلاعات

فرم رضایت

نام کودک: _____ تاریخ تولد: _____

نام سرپرست قانونی: _____

بله، من رضایت خود را (در طول مدت بازدید از مرکز) می دهم که در صورت درخواست مقامات حفاظت در برابر تشعشعات، به فرزندم تابلیت پتاسیم ایوداید بدهم. من تأیید می کنم که از هیچ گونه عدم تحمل یا منع مصرف قرص برای فرزندم اطلاعی ندارم و در صورت مشاهده هرگونه عدم تحمل یا منع مصرف، فوراً به مکتب اطلاع خواهم داد.

نخیر، من رضایت نمی دهم

تاریخ: _____ امضا: _____

اطلاعات مربوط به تابلیت های پتاسیم ایوداید (از دستورالعمل استفاده)

تابلیت پتاسیم ایوداید نباید مصرف شود:

- اگر غده تیروئید زیاد فعال دارید
- ندول های خوش خیم تیروئید که درمان نشده. با این درمان نشده "گره های تیروئید داغ" درمان نشده خطر تولید بیش از حد هورمون های تیروئید وجود دارد که در بدترین حالت می تواند منجر به واکنش های قلبی عروقی تهدید کننده زندگی شود.
- در صورت حساسیت (حساسیت) به اویدین. این بسیار نادر است و نباید با آلرژی رایج به مواد حاجب (که برای بهبود نمایش اندام های مختلف در روش های تصویربرداری مانند تشخیص ایکس ری یا اشعه ایکس استفاده می شود) اشتباه گرفته شود.
- اگر به هر یک از اجزای دیگر قرص ها (نشاسته جواری، مونوهیدرات لاکتوز، سیلوز میکروکریستالین، بنیادی بیوتل میتاکریلیت کاپولیمیر، مگنیزیم استئارات) حساسیت دارید.
- اگر به **dermatitis herpetiformis Duhring** (بیماری که باعث تاول، قرمزی پوست، دانه، کهپر و سوزش شدید، ترجیحاً در آرنج یا زانو می شود) دارید.
- در التهاب دیواره رگ های خونی ناشی از آلرژی (hypocomplementemic vasculitis).

هنگام استفاده تابلیت های پتاسیم ایوداید مراقبت های ویژه لازم است:

- اگر مشکوک به تومور بدخیم غده تیروئید باشد. تومورهای تیروئید با ایودین رادیواکتیو درمان می شوند. اگر پتاسیم ایوداید به مقدار زیاد مصرف شود، می تواند درمان تومور را غیرممکن کند.
- اگر بیماری دارید که لوله هوای تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد. دادن سطوح بالای ایودین می تواند باعث رشد غده تیروئید شود و تنگی لوله هوای تنفسی موجود را بدتر کند.
- اگر کودک شما تحت درمان با مهارکننده های تیروئید (دوهای ضد تیروئید) است. لطفاً از داکتر خود پرسید که آیا کودک شما می تواند تابلیت پتاسیم ایوداید مصرف کند یا خیر.

مصرف تابلیت پتاسیم ایوداید همراه با سایر دواهای دیگر

- عملکرد تابلیت های پتاسیم ایوداید تحت تأثیر موارد زیر است:
دوایی که بر متابولیسم تیروئید تأثیر می گذارند (مانند پرکلرات، تیوسیانات در غلظت های بالای 5 میلی گرم/در دسی لیتر). آنها جذب ایودین توسط تیروئید را مهار می کنند.
- تابلیت پتاسیم ایوداید بر عملکرد موارد زیر تأثیر می گذارد:
مهارکننده های تیروئید (تیروستاتیکا)
پتاسیم ایوداید **G.L حاوی لاکتوز است**. اگر می دانید که کودک شما به قند حساسیت دارد، لطفاً از داکتر خود پرسید که آیا کودک شما می تواند تابلیت پتاسیم ایوداید مصرف کند یا خیر.

چه عوارض جانبی ممکن است؟

مانند همه داروها، تابلیت پتاسیم ایوداید می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد دچار آن نمی شوند. عوارض جانبی زیر مشاهده شده است:

نادر (ممکن است از هر 1000 نفر 1 نفر را تحت تأثیر قرار دهد):

- یک آلرژی ناشناخته به ایودین ممکن است برای اولین بار ظاهر شود. علائم آلرژیک مانند سرخی پوست، خارش و سوزش چشم، آبریزش بینی، سرفه خشک، اسهال، سردرد و علائم مشابه ممکن است رخ دهد. واکنش های تهدیدکننده حیات، به ویژه در مورد درمان تیتس هریبی فورمیس دورینگ (بیماری که در آن، از جمله، تاول ها و سرخی پوست، ترجیحاً روی آرنج یا زانو رخ می دهد، ممکن است (به بالا مراجعه کنید: «تابلیت های پتاسیم ایودید نباید مصرف شوند.»)
- التهاب عروقی (مانند پری آرتریت ندوزا).

بسیار نادر (ممکن است از هر 10000 نفر 1 نفر را تحت تأثیر قرار دهد):

- پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید مرتبط با ایودین. علائم پرکاری تیروئید می تواند شامل افزایش ضربان قلب، عرق کردن، بی خوابی، لرزش، اسهال و کاهش وزن با وجود افزایش اشتها باشد. اگر چنین علائمی دارید، باید با داکتر مشورت کنید.

ناشناخته (از دیتا موجود نمی توان تخمین زد):

- تحریک مخاط معده ممکن است رخ دهد، به خصوص هنگام مصرف تابلیت پتاسیم ایوداید با معده خالی.
- التهاب غدد بزاقی
- ناراحتی در دستگاه گوارش (ناراحتی در راه معده)
- بثورات خفیف

قانون کلی:

در صورت نیاز به اطلاعات یا مشاوره بیشتر از داکتر یا دواساز (دواخانه) خود پرسید.